

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2018-05-14

(20. hét)

Fenofázis: : intenzív hajtásnövekedés, fürtmegnyúlás, (védett déli fekvésű helyeken korai fajtáknál virágzás kezdett)

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség összesen 26,5 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony időjárás miatt **gyenge, közepes lisztharmat veszélyt** jeleznek. Az elmúlt heti csapadéknak köszönhetően megjelentek az első aszkospórák (primer) fertőzések az idősebb fás részekhez közeli apró levelek fonákán. (A tünetes levelek gyakorisága számomra aggasztó. A szőlő még szép, de ha most nem kellőképpen védekezünk a lisztharmat ellen, akkor későbbiekben komoly lisztharmatfertőzés is kialakulhat.) Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. 10 mm feletti esőt (a múlt héten teljesültek a fertőzéshez szükséges feltételek) követően a kórképek megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Figyelem: A hételején változékony csapadékos időjárásra lehet számítani. A hét második felébe újra melegszik az idő, csütörtöktől a csapadékhajlam is csökken. Hétvégén 25-26 C°-os maximum hőmérséklet várható. Jelentősebb mennyiségű csapadék hétfőn, kedden és szerdán lehet.

Az elmúlt hetekben a csapdázott szőlómolyok (tarka szőlómoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. Ha virágzik a szőlő, akkor is el lehet, sőt el kell végezni a hajtásigazítást, törzstisztítást és a permetezést!

Ezen a héten a BASF növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: Kumulus S, Sercadis, Vivando

Peronoszpóra ellen: Delan 700 WG, Polyram DF, Acrobat MZ WG

Szőlómolyok ellen: Fendona 10 EC

Ezen a héten a Syngenta növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: ThiovitJet, Topas 100EC, Dynali

Peronoszpóra ellen: Bravo 500, Neoram 37,5 WG Ridomil Gold MZ 68 WG

Szőlőmolyok ellen: KarateZeon 5 Cs, Affirm

Atkák és tripszek ellen: Vertimec Pro kizárólag önmagába kijuttatva AKG-s területeken egy tenészedőszakban legfeljebb egy alkalommal használható

Badacsonyban az amerikai szőlőkabóca L1-es lárváját megtaláltuk, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell.

Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák eléri az L₂-L₃ lárvastádiumot.

Badacsony, 2018. május 14.