

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2019-07-26

(30. hét)

Fenofázis: **fürtzáródás, zsendülés kezdet, érés**

Badacsonyan a késői érésű fajták fürtjei fürtzáródásban, részleges zsendülésben, míg a középérésű fajták fürtjei zsendülnek. A korai fajták érnek.

Öregapám mondaná: Tornyosulnak a felhők és erősen tűz a nap. Érik a vihar. Ennek az időnek még böjtje lesz.

De azt is mondaná: Fiam a vantól nem kell félni. Szép a szőlő szép a szőlő, de még sokat alszik kint. Valóban szép a szőlő, de tárolókapacitás és piac hiányában fájhat a gazda feje, hogy mit kezdjen a megtermelt szőlővel. A vantól mégis félni kell? Remélem nem és azt is remélem, hogy mindenkinek sikerül a megtermelt szőlőjét feldolgozni vagy értékesíteni.

A múlt héten Badacsonyan 5,0 mm csapadék esett.

A héten péntek reggelig nem esett eső, de az előrejelzések alapján péntek délutántól várható záporok, zivatarokból akár jelentős mennyiségű csapadékra (remélhetőleg jég nélkül) is lehet számítani. A kánikulát a hét végén záporos, zivataros időjárás váltja fel.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek.

A bogyók héja elviaszosodott, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Lisztharmat ellen kontaktkészítményekkel védekezni kell.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható elsősorban kontaktkészítmények alkalmazásával.

Peronoszpóra már csak a lombot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak sincs már sok ideje hátra, ahhoz hogy a fürtöket fertőzni tudja. 1-2 hét múlva már csak a lombot tudja károsítani, de addig még meglepetéseket is okozhat. (Igaz több évjáratban is láttam már megzsendült érőfélben lévő fürtön vigéckedő lisztharmatot.)

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján **nem szükséges.** Amennyiben csapadékosra fordulna az idő, akkor preventív védekezés javasolható.

Feketerothadás ellen preventív védekezés javasolható. Mind a négy kórokozó kórképe kisebb-nagyobb mértékben megtalálható a borvidék szőlőültetvényeiben.

25°C felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben. Júliusban a fitoplazma tüneteinek megjelenésére is számítani kell. Ezen tőkét célszerű megjelölni és lehetőleg eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.

Figyelem: A kánikulát a hét végén záporos, zivataros időjárás váltja fel. 25-28°C-os maximum hőmérséklettel.

A zöld cserebogarak rajzása Badacsonyan befejeződött.

A tarka szőlómoly második nemzedékének rajzása befejeződött a lárvakelés elkezdődött, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rajzáscsúcsot követően a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve célszerű az inszekticides kezelést elvégezni.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelten levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

Törekedni kell akár a második csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Erdőségeken főleg, de belterületen is tapasztalható az őzek, szarvasok és vaddisznók jelenléte és a kártételük is. A malacos koca „kondája”, az őzek és szarvasok éjszakai duhajkodásának nyomai tetten érhetőek nyomok, letépett, lecsípett, leszakított hajtások formájában. Mára már annyira felbátorodtak, hogy fényes nappal is megfigyelhetjük a vadat az ültetvényekbe. Belterületen a vaddisznókérdés nem csak a vadásztársaság felelőssége, hanem önkormányzati és lakossági felelősség is. Ha mindenki az elhanyagolt területeket rendbe tartaná, a háztartási hulladékot megfelelően tárolná elszállításig, valamint a hullott gyümölcsöt is összeszedné, akkor lényegesen kevesebb lenne a vaddisznók által okozott bosszúság. **Jó hír: újra indult az élve befogás. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park munkatársai élve befogó csapdák kihelyezésével gyérítik a vaddisznó állományt. Az így befogott egyedeket vaddisznós kertekbe szállítják el.**

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjek el riasztani. A seregélyek még fűgéznek, de a füge, bodza és a szeder után a szőlő is sorra fog kerülni.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (Nitrogén hiány, vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembe vételével történjenek! (pl. mankoceb- és egyes metiram hatóanyagot tartalmazó készítmények élelmezésegészségügyi várakozási ideje 56 nap)

Ezen a héten a BASF növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: Kumulus S

Peronoszpóra ellen: Delan Pro

Szürkerothadás ellen: Scala

Szőlómolyok és Amerikai szőlőkabóca ellen: Fendona 10 EC

Ezen a héten a Syngenta növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: ThiovitJet

Peronoszpóra ellen: Bravo 500, Neoram 37,5 WG

Szürkerothadás ellen: Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG

Szőlómolyok ellen: Affirm

Amerikai szőlőkabóca és szőlómolyok ellen: Karate Zeon 5CS

Atkák és tripszek ellen: Vertimec Pro kizárólag önmagában kijuttatva AKG-s területeken egy tenyészedőszakban legfeljebb egy alkalommal használható

Az imágók rajzása folyamatos. A borvidék azon szőlőterületein, ahol kötelező védekezés van elrendelve, ott a második kifejezetten kabócák elleni védekezést most kell elvégezni! Záró permetezésbe július végén, augusztus elején célszerű még egy harmadik kabócák elleni védekezést beiktatni!

Üvegházi felhasználásra korlátozták a neonikotinoidokat

Az Európai Bizottság döntése alapján 2018. december 19-től kizárólag zárt termesztő berendezésben lehet felhasználni a házi méhekre és egyéb beporzó szervezetekre kockázatosnak ítélt három neonikotinod hatóanyagot - *imidakloprid, klotianidin, tiametoxam* – tartalmazó növényvédő szereket. A határidőt követően a kezelt növényeket is tilos lesz szabadföldre kiültetni. A Nébih az új előírásoknak megfelelően módosította a hazai növényvédő szer engedélyeket, amelyek megtalálhatók az engedélyezési adatbázisban. (forrás: NÉBIH)

(Ökológiai (Bio) termesztésben és átállás alatt levő területeken eredményesen a Laser és a 120 napos esti engedéllyel rendelkező Piretro Natura készítmények használhatók az amerikai szőlőkabóca ellen. A Piretro Natura készítmény használatának esetén az illetékes növényvédelmi hatóságnál kell regisztrálnia magát a termelőnek.)

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejllett imágók rajzásának megfigyelésére kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Megyei Kormányhivatal aktuális védekezési felhívását!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de az Amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabóca egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Badacsony, 2019. július 26.